

***Anacheilium radiatum* (Lindl.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto 1981**

Sinónimo: *Prostechea radiata* (Lindl.) W.E. Higgins 1997



Subfamilia: Epidendroideae

Tribu: Epidendrea

Subtribu: Laeliinae

Fenología: El nombre del género proviene del griego para arriba o encima del labio, en alusión a la posición del labelo.

Descripción: Hierba epífita, de crecimiento simpodial, con raíces largas, carnosas, subcespitosas, con tallos secundarios cortos.

Seudobulbos agrupados, fusiformes, a ovoides, alargados, surcados, un poco rugosos, con vainas escariosas que pueden medir hasta 6.5 cm de largo. Elseudobulbo mide de 8-10.5 cm de largo por 6cm de ancho. Esta especie tiene una particularidad y que algunosseudobulbos salen apicalmente de otroseudobulbo. Este nuevoseudobulbo es corto, aplanado bilateralmente, siempre surcado. Con vainas tubulares.

Las hojas, dos por cadaseudobulbo, son lanceoladas a elípticas, de textura suave, ápice agudo, enteras, colgantes, miden de 20-32 cm de largo por 4 cm de ancho.

Inflorescencia apical, indeterminada, en racimo, con 7-12 flores por pedúnculo el cual mide 16 cm de largo en promedio.

Las flores son alternas, con brácteas en la base del peciolo, fragantes, con olor parecido a la canela. El peciolo mide 2.4 cm de largo.

Como es característico de este género, los pétalos están alreves, el sépalo dorsal está enfrente, donde comúnmente está el labelo, y este a su vez está en la posición del sépalo dorsal.

El sépalo dorsal es oblongolanceolar, rígido, carnoso, brillante, márgenes convolutos, erecto. La parte apical es cóncava, presenta venaciones color verde oscuro muy visibles en el haz que es de color verde cremoso, y el envés es de un verde suave con ápice agudo. Mide 1.6 cm de largo por 0.65 cm de ancho.

Los sépalos laterales están detrás del labelo, con los bordes convolutos, mas enrollados que el dorsal, cóncavos. Forma orbicular, carnosos, brillante y la misma disposición de tonos en el haz y el envés que el dorsal. Mide 1.6 cm de largo por 0.7 cm de ancho.

Pétalos orbiculares con ápice agudo, brillantes, carnosos, con un surco o banda verduzca en el centro. Mide 1.8 cm de largo por 0.9 cm de ancho.

Labelo unido a la columna en la mitad de esta. Tiene forma de casquete, o concha, con márgenes ondulados, líneas purpuras que recorren el labelo desde la base hasta los márgenes. Cinco en cada lado y tres líneas centrales

más gruesas que las demás y que están encima del disco que es carnoso. Mide 1.3 cm de largo por 2.1 cm de ancho.

La columna es corta, erecta, cilíndrica, carnosa, con dientes a los lados y ciliada en el centro, su color es amarillo. Mide 0.8 cm de largo.

Distribución en Honduras: Prácticamente todo el país, Cortes, Comayagua, Ocotepeque, Francisco Morazán, Olancho. Común de bosques latifoliados de 1000 a 1500 msnm.

Fenología: de Abril a Julio.

Referencias:

1. Alrich, Peggy and Wesley Higgins. 2008. The Mary Selby Botanical gardens, illustrated dictionary of orchid genera. Edited by Bruce Hansen. Selby Botanical gardens press.
2. Withner, C.L. and Patricia Harding. 2004. The catleyas and their relatives. The debatable Epidendrums. Timber press.