

**Anacheilium chacaoensis**



**Subfamilia: Epidendroideae**

**Tribu: Epidendreae**

**Sub tribu: Laeliinae**

Planta epifita, simpodial, con rizomas muy alargados ya que su hábitat son lugares semi secos (bosques de pino y liquidámbar).

La biomasa de los rizomas es densa pero no llega a características cespitosas.

Los pseudobulbos son ovoides alargados, sus dimensiones van de 9 a 12 cm. De largo y con un ancho de 2.5 a 4.5 cm; presenta una capa extremadamente fina para protección de los pseudobulbos que no los recorre totalmente si no que, hasta un poco más arriba de la parte media.

Con hojas oblongas de longitud de entre 24 a 26 cm y de ancho de casi 7 cm. las hojas son poco duras y con una nervadura central principal y bien visible.

La inflorescencia es apical formando una cima, de 4 – 7 flores por cada cima, las flores son de un olor agradable e intenso, de color verde- amarillo; los sépalos laterales son más largos que el sépalo dorsal, pero la diferencia es mínima.

La flor mide de extremo a extremo, es decir, longitud de los sépalos laterales de 3 a 4 cm.

El labelo es muy llamativo, de color blanco con líneas que viajan verticalmente y paralelas entre sí por toda esta estructura, dichas líneas son de color purpura el labelo termina en un ápice en forma de aguijón.

Los pétalos y sépalos dan una impresión a simple vista de tener el haz como brillante o escarchada.

La columna es visible a vista cercana

La fenología está entre los meses de febrero a marzo.

El género de esta especie (*chacaoensis*) se debe a que esta especie se registró por primera vez en la región del Chacao en Colombia.