


*Mormodes ehippilabia*



***Subfamilia: Epidendroideae***

***Tribu: cymbidieae***

***Subtribu: catasetinae***

Planta epífita de bosques secos abiertos. De hábito saprofítico sobre troncos podridos. Endémica de Honduras.

Los rizomas son abundantes pero no están unidos entre sí, los pseudobulbos son de forma fusiforme y son segmentados; generalmente presenta 6 segmentos, los pseudobulbos jóvenes están cubiertos por una vaina protectora fina de color blanca. Son de forma distintas: ovoides, cónicos alargados, semiovoides alargados; no presentan pelos ni vellosidades (glabro).

Hojas flabeliformes.

La inflorescencia es lateral, de tipo simple, no ramificada muy probablemente indefinida; va saliendo de los segmentos inferiores del pseudobulbo, generalmente desprovistos de hojas. Las flores son muy llamativas por su forma y poseen fragancia. Son resupinadas, pues el labelo está doblado en un ángulo de 180 grados, o sea al revés de la mayoría de las flores. El sépalo dorsal está libre, con forma un tanto puntiaguda. Los sépalos laterales están adnados al pie de la columna y los tres presentan líneas de color marrón. Los pétalos son más anchos que los sépalos y doblados sobre el labelo.

Florece en los meses de diciembre a enero.