


Oncidium ensatum



Subfamilia: Epidendroideae

Tribu: maxillarieae

Sub tribu: Oncidiinae

Antes se le conocía como *Oncidium cerebriferum*; esta planta es mayormente terrestre, de bajas elevaciones, de buen tamaño, de lugares algo secos a poco húmedos, se le puede encontrar en la zona central del país.

Presenta rizomas cortos y pseudobulbos bifoliados, comprimidos, heteromorficos, algunos lisos en el caso de los jóvenes, otros son rugosos y acanalados; están envueltos con vainas fuertes, son imbricados, mide 8 cm de largo por 5.5 cm de ancho, son oblongos, de color verde tierno, al igual que las hojas, que son muy largas y angostas, lanceoladas, erectas, subcoriaceas, carinadas dorsalmente. (Jack Pahl), miden hasta 90 cm de largo por 2.5 cm de ancho.

La inflorescencia es una panícula que sale axilarmente del pseudobulbo, seguido el pedúnculo muy largo, de hasta 90 cm. Presenta ramas espaciadas, las flores son numerosas, los sépalos y pétalos son de color café claro, con márgenes ondulados. El labelo es amarillento, trilobulado, también ondulado McLEISH *et al*, 1995; menciona que tiene en forma de violín, los lóbulos laterales del labelo son en forma auricular, redondeados en el ápice. El lóbulo central o frontal está separado de los otros dos lóbulos por un istmo, con unos órganos salientes (apículas).

La fenología se da en los meses de marzo a abril y las flores duran más de dos semanas.