

Specklinia barbulata



Subfamilia: Epidendroideae

Tribu: Epidendreae

Sub tribu: Pleurothallidinae

Hasta el 2004 se le conocía con el nombre científico *Pleurothallis barbulata*.

Es una planta epífita, de crecimiento simpodial, es del grupo de las orquídeas miniaturas; presenta rizomas alargados y delgados, con pseudobulbos reducidos, redondos, aplanados, de superficie rugosa con una coloración verde de jóvenes y envueltos en una vaina. Pueden ser tri ó cuatrefoliales, con una hoja apical y las demás axilares, las hojas son pequeñas sub coriáceas, enteras y van de una coloración de verde a marrón, miden de largo 2.5 – 4.0 cm y de ancho 1.5 a 2.5 cm, son de forma oblonga.

La inflorescencia es una espiga, es una inflorescencia completa (las flores apicales se abren antes que las inferiores a ellas), de 3 a 4 flores abiertas al inicio; la inflorescencia es apical y sale de entre las hojas axilares, salen 2 inflorescencias a la vez; las flores son pequeñas, alternas, muy atractivas, con el pedúnculo de la inflorescencia es segmentado y bracteado y tiene un largo de 10 cm. El labelo es amarillo con manchas o bandas rojizas (maculado). El sépalo dorsal del mismo tamaño que los sépalos laterales, El sépalo dorsal con la punta resupinada. Los pétalos un poco más grandes que los sépalos. El peciolo de la flor mide 1.0 a 1.4 cm de largo.

La fenología es de febrero a marzo, las flores duran aproximadamente 2 semanas.